



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Nova methodus numeros compositos a primis dignoscendi illorumque factores inveniendi.

P. SEELHOFF.

Quaeruntur divisores numeri N .

$$\text{Sit } N = w^2 + r$$

atque $N \equiv \rho(p)$, ρ significante residuum aliquod quadrati cum ipsius p , numeri primi, ita ut $w_1^2 \equiv \rho(p)$ existat.

Sumatur $N = w^2 + (w + w_1)(w - w_1) + r$ et designetur $(w + w_1)(w - w_1) + r$ litera b , unde sequitur $b = w^2 + r - w_1^2$.

$$\begin{array}{rcl} \text{At} & w^2 + r & \equiv \rho(p) \\ & - w_1^2 & \equiv -\rho(p) \end{array}$$

$$\text{hinc} \quad b = w^2 + r - w_1^2 \equiv 0(p)$$

Radix w_1 in $w_1 + py$ amplificata dat

$$N = (w_1 + py)^2 + \{w + (w_1 + py)\}\{w - (w_1 + py)\} + r.$$

Repertis ergo valoribus w , pro numeris primis usque ad 97 circiter, nisi N nimis magnus est (15 figuras non excedens) et pro binariis illorum potestatibus (pro 2, 3, 5 altiores etiam potestates adhibendae sunt), sin autem N major est, modulo congruentiarum pari passu extenso, plures simplices binariae quadratae repraesentationes comparando illos valores evadent et sequentia statui possunt.

Si numerus N compositus est, mox aut duas repraesentationes ejusdem determinantis aut plures adipisceris, e quibus eliminandis communibus factoribus duae ut

$$a_1^2 + mc_1^2 = \mu N$$

$$\text{et } a_2^2 + mc_2^2 = \nu N$$

sequuntur, quae ad dispares radices congruentiae $z^2 \equiv -m(N)$ pertinent itaque duos divisores ipsius N producunt.

Sin vero numerus N est primus, haud secus facile ad tales eliminationes pervenies, quae e contrario ad eandem radicem $\pm z$ perducunt. N numerum primum esse pluribus determinantibus unius factoris evadentibus aut ambobus determinantibus $+\Delta$ et $-\Delta$ saepius occurrentibus affirmatur. Certitudinis causa auxilio determinantum repertorum omnes illi numeri primi quorum hi non-residua sunt quasi inepti ad divisionem excludi possunt.

Variatio quaedam utilis erit, nisi N formam $8n + 1$ praebet. Sit *e. g.*, $N = 8n + 3$; jam ponatur $N = 3w^2 + r$ et $w_1^2 \equiv \frac{\rho + px}{3} (p)$, ita ut aliis numeris primis opus sit. Hoc modo factor 2^n pro b non omittitur.

Habemus similiter atque prius

$$\begin{aligned} N &= 3w_1^2 + 3(w + w_1)(w - w_1) + r. \\ \text{At } 3w^2 + r &\equiv \rho (p) \\ -3w_1^2 &\equiv -(\rho + px) \equiv -\rho (p), \text{ unde} \\ b &= 3(w + w_1)(w - w_1) + r \equiv 0 (p). \end{aligned}$$

Pro calculo ipso ponatur

$$\begin{aligned} w \mp (w_1 + py) &= \alpha, \text{ unde} \\ w_1 + py &= \pm (w - \alpha) \text{ et} \\ w + (w_1 + py) \text{ aut } w - (w_1 + py) &= 2w - \alpha \\ N &= (w - \alpha)^2 + 2(w - \alpha)\alpha + r. \end{aligned}$$

Sit praeterea

$$\begin{aligned} 2w &\equiv \pm 2\beta (p) \\ r &\equiv \gamma (p), \end{aligned}$$

tum solvenda est congruentia

$$\begin{aligned} (\pm 2\beta - \alpha)\alpha &\equiv -\gamma (p) \text{ sive} \\ \alpha^2 \mp 2\beta\alpha &\equiv \gamma (p) \text{ et ponendo} \\ \alpha &= \pm \beta + z \\ z^2 - (\beta^2 + \gamma) &\equiv 0 (p). \end{aligned}$$

Est autem

$$\begin{aligned} \beta^2 &\equiv w^2 \\ \gamma &\equiv r \\ \beta^2 + \gamma &\equiv w^2 + r \equiv \rho (p), \text{ sive ut antea} \\ z^2 - \rho &\equiv 0 \text{ et } z = w_1. \end{aligned}$$

Sit, ut ad finem perveniam

$$\begin{aligned} \beta &= \pm (w - py), \text{ habetur atque prius} \\ \alpha &= w \mp (w_1 + py). \end{aligned}$$

Congruentiae igitur et aequationes, quibus tota methodus nititur, hae sunt :

$$N = w^2 + r \quad N \equiv \rho_1(p), \quad w_1^2 \equiv \rho_1(p)$$

$$w \equiv \pm \beta_1(p)$$

$$\alpha = \pm \beta_1 + w_1$$

praeterea $N \equiv \rho_2(p^2), \quad w_2^2 \equiv \rho_2(p^2)$

$$w \equiv \pm \beta_2(p^2)$$

$$\alpha = \pm \beta_2 + w_2$$

pro 2, 3, 5 denique $N \equiv \rho_n(p^n), \quad w_n^2 \equiv \rho_n(p^n)$

$$w \equiv \pm \beta_n(p^n)$$

$$\alpha = \pm \beta_n + w_n$$

$$b$$

$$N = (w - \alpha)^2 + (2w - \alpha)\alpha + r.$$

Si numerus $N = 8n + 3$, etc., ponendum est $N = 3w^2 + \rho$, et loco congruentiarum

$$w_1^2 \equiv \rho_1(p), \quad w_2^2 \equiv \rho_2(p^2), \quad w_n^2 \equiv \rho_n(p^n)$$

ponendae sunt

$$w_1^2 \equiv \frac{\rho + px}{3}(p), \quad w_2^2 \equiv \frac{\rho_2 + p^2}{3}(p^2), \quad w_n^2 \equiv \frac{\rho_n + p^n}{3}(p^n) \text{ etc.}$$

et loco

$$N = (w - \alpha)^2 + (2w - \alpha)\alpha + r \text{ aequatio}$$

$$b$$

$$N = 3(w - \alpha)^2 + 3(2w - \alpha)\alpha + r$$

ponenda est, etc.; reliqua intacta remanent.

Dentur exempla :

I.

$$N = 7.2^{34} + 1 = 120259084289$$

$$N = 346783^2 + 635200, \text{ unde}$$

$$w = 346783$$

$$N = (346783 - \alpha)^2 + (693566 - \alpha)\alpha + 635200$$

$$N \equiv 20(31), \quad \rho_1 = 20; \quad w \equiv +17(31), \quad \beta_1 \equiv -14$$

$$w_1^2 \equiv 20(31), \quad w_1 = \pm 12$$

$$\alpha = -14 \pm 12 = 5 \text{ et } 29$$

$$\text{sive } \alpha = 31y + 5, \quad 29$$

$$N \equiv 764(31^2), \quad \rho_2 = 764 \quad w \equiv +823(31^2), \quad \beta_2 = -128$$

$$w_2^2 \equiv 764(31^2), \quad w_2 = \pm 198$$

$$\alpha = -128 \pm 198 = 60 \text{ et } 625$$

$$\text{sive } \alpha = 31^2y + 60, \quad 625.$$

Hoc modo reperitur

$$\begin{aligned}
 \alpha &= 2^3y + 0, 2, 4, 6; 2^4y + 0, 6, 8, 14; 2^5y + 0, 14, 16, 30; \\
 &2^6y + 0, 30, 32, 62; 2^7y + 30, 32, 94, 96; 2^8y + 30, 32, 158, 160; \\
 &2^9y + 158, 160, 414, 416; 2^{10}y + 158, 160, 670, 672. \\
 \alpha &= 5y + 0, 1; 5^2y + 0, 16; 5^3y + 16, 50; 5^4y + 141, 300. \\
 \alpha &= 7y + 2, 4; 7^2y + 2, 18. \\
 \alpha &= 11y + 2, 3; 11^2y + 47, 68. \\
 \alpha &= 19y + 1, 8; 19^2y + 115, 331. \\
 \alpha &= 31y + 5, 29; 31^2y + 60, 625. \\
 \alpha &= 37y + 12, 26; 37^2y + 271, 581. \quad (1369) \\
 \alpha &= 47y + 10, 24; 47^2y + 762, 1387. \quad (2209) \\
 \alpha &= 53y + 12, 49; 53^2y + 261, 2291. \quad (2809) \\
 \alpha &= 67y + 2, 47; 67^2y + 114, 2146. \quad (4489) \\
 \alpha &= 71y + 1, 37; 71^2y + 3871, 4119. \quad (5041) \\
 \alpha &= 97y + 45, 68; 97^2y + 1911, 4798. \quad (9409) \\
 \alpha &= 127y + 49, 97; 127^2y + 1748, 14400. \quad (16129)
 \end{aligned}$$

Habetur

- (1) $N = 344833^2 + 2.7.11.2960^2$ (Ex $\alpha = 1950, 5y + 0$ cum $37^2y + 581$)
- (2) $N = 203351^2 + 7.106172^2$ (Ex $\alpha = 143432, 11y + 3$ cum $127^2y + 14400$)
- (3) $N = 350619^2 - 2.11.11026^2$ (Ex $\alpha = -3836, 11y + 3$ cum $37^2y + 271$)

Ex (1) et (2) sequitur (4) $11.832082029^2 - 2.150479740^2 = 62953059.N$
unde, comparando cum (3),

$$50459950484647^2 - 26380527979530^2 = \mu.N.$$

Maximus communis divisor differentiae $50459950484647 - 26380527979530$ et ipsius N , *i. e.* 317306291 est factor quaesitus, alter est 379 .

II. Membrum quadragesimum octavum seriei $0, 1, 1, 2, 3, 5 \dots$ est

$$\begin{aligned}
 N &= 2971215073 = 54508^2 + 93009, \text{ et} \\
 w &= 54508
 \end{aligned}$$

b

$$N = (54508 - \alpha)^2 + \frac{b}{(10916 - \alpha)\alpha + 93009}.$$

Simili modo atque in antecedente exemplo habebitur

pro 1, $\alpha =$	59	$b =$	$2.7.17.72^2$
2, $\alpha =$	4109	$b =$	$2.3.7.3204^2$
3, $\alpha =$	1	$b =$	$2.3.23.29.2^2$
4, $\alpha =$	387	$b =$	$-3.7.17.344^2$

5, $\alpha = -$	831	$b = -$	$2.3.23.31.146^2$
6, $\alpha = -$	5987	$b = -$	$2.7.97.712^2$
7, $\alpha =$	93	$b =$	$17.29.144^2$
8, $\alpha = -$	7519	$b = -$	$2.31.37.618^2$
9, $\alpha = -$	3187	$b = -$	$2.3.7.31.524^2$
10, $\alpha =$	1517	$b =$	$2.7.17.828^2$
11, $\alpha =$	3323	$b =$	$3.7.17.992^2$
12, $\alpha =$	3827	$b =$	$3.7.29.43.124^2$
13, $\alpha = -$	7051	$b = -$	7.10812^2
14, $\alpha =$	15421	$b =$	$7.31.37.424^2$
15, $\alpha = -$	28707	$b = -$	$2.7.23.3504^2$
16, $\alpha =$	31143	$b =$	$2.3.43.3066^2$
17, $\alpha =$	20561	$b =$	$2.17.7314^2$
18, $\alpha = -$	5891	$b = -$	$23.37.43.136^2$
19, $\alpha = -$	13573	$b = -$	$3.7.23.1856^2$
20, $\alpha =$	18305	$b =$	$2.3.7.23.73.406^2$
21, $\alpha = -$	94257	$b = -$	$2.3.23.3204^2$
22, $\alpha =$	21801	$b =$	$2.3.17802^2$
23, $\alpha = -$	24383	$b = -$	$2.7.23.29.31.106^2$
24, $\alpha =$	19	$b =$	7.556^2
25, $\alpha = -$	99	$b = -$	$2.3.1336^2$, etc. etc.

- (a) Ex 15 habemus $83215^2 - 2.7.23.3504^2 = N$
 " 19 " $68081^2 - 3.7.23.1856^2 = N$, unde sequitur
 $3.4969913^2 - 2.4826470^2 = 9259 \cdot N$ et
 $1670196456^2 \equiv 6(N)$.

Eadem congruentia ex 25

$$54607^2 - 2.3.1336^2 = N$$

derivari potest. Idem attingit in aliis casibus.

(b) Perspicuum est, multas repraesentationes atque $x^2 + cy^2 = \mu N$ eliminandis communibus factoribus formari posse, quarum determinans ex uno factore constat.

(c) Habentur determinantes $+7(13)$ et $-7(24)$; $+6(25)$ et $-6(22)$ etc.

Unde concludi potest, numerum N esse primum. Revera auxilio determinantium repertorum cuncti numeri primi usque ad \sqrt{N} quasi inepti ad divisionem excludendi sunt; numerus 2971215073 est igitur numerus primus.

Ut valor ipsius α quam facillime obtineatur, tabulas composui, exhibentes radices congruentiae

$$w_1^2 \equiv \rho_1(p)$$

pro numeris a 7 usque ad 199, radices congruentiae $w_2^2 \equiv \rho_2(p^2)$

pro numeris a 7² usque ad 47², radices congruentiae $w_n^2 \equiv \rho_n(p^n)$

pro 2³ usque ad 2¹⁰, 3' usque ad 3⁶, 5' usque ad 5⁴.

Praeterea autem tabulas auxiliares construxi pro modulo p^2 a 53² usque ad 199².

Nam

$$\rho_2 \equiv \rho_1(p) \text{ sive } \rho_2 = q \cdot p + \rho_1$$

$$w_1^2 \equiv \rho_1(p) \text{ sive } w_1^2 = q_0 p + \rho_1$$

$$2\rho_1 u \equiv 1(p) \text{ et}$$

$$(q - q_0)u \equiv \delta(p)$$

sequitur $w_2 = \pm \delta + w_1$.

Tabulae auxiliares amplectuntur igitur quatuor columnas, quarum inscriptiones sunt

$$\rho_1 \cdot q_0 \cdot u \cdot w_1.$$

BREMEN, Mai 1885.